



ООО «ЭлитЛаб»
ИНН 263801351 | ОГРН 1112651015443
Тел.: +7 (938) 302 23 86
www.kdlmed.ru | e-mail: info@kdlmed.ru

Контактный телефон

$$+ 7(\quad \quad \quad)$$

Фамилия ИО пациента

[illegible]

Направитель/Организация

[illegible]

№ Сервис-карты	Дата рождения (ч/м/г)			Пол		Код контингента	Бер/нед
/ / / / /	/	/	/	М	Ж	/ /	/

Адрес места жительства*:

Паспортные данные

(регион, район, город/нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Серия	№	Дата выдачи			Выдан
/ / /	/ / / / /	/	/	/	

КОД врача	Фамилия ИО врача _____
/ / / /	Фамилия ИО м/с _____

Страховая компания

Серия	№	Дата выдачи
/	/ / / / / / / / / /	/ / /

*Для граждан РФ по паспорту, для иностранных граждан по документу, подтверждающему регистрацию на территории РФ

****При конфиденциальном обследовании персональные данные на пациента приводятся без сокращений по паспорту.**

Материал	Дата забора		Время	№ пробирки
	Вид биоматериала _____			

Общее количество тестов, отмеченных на бланке

The diagram consists of five identical light blue rectangles placed side-by-side. Each rectangle has a thin black border at its corners, resembling a frame or a corner bracket. In the center of each rectangle, the Russian word "штрих-код" (shchrih-kod), which means "barcode", is written in a dark blue sans-serif font.

KP018

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

Определение специфических иммуноглобулинов класса Е

	11-604	Аллерген с68 - Артикаин / Ультракаин, IgE
	11-605	Аллерген с88 - Мепивакаин / Полокаиин, IgE
	11-606	Аллерген с82 - Лидокаин / Ксилокаин, IgE
	11-607	Аллерген с83 - Прокаин / Новокаин, IgE
	11-608	Аллерген с86 - Бензокаин, IgE
	11-609	Аллерген с100 - Прилокаин / Цитанест, IgE
	11-610	Аллерген с89 - Бупивакаин / Анекаин / Маркаин, IgE
	11-611	Аллерген с210 - Тетракаин / Дикаин, IgE
	11-612	Аллерген к40 - Никель, IgE
	11-613	Аллерген к41 - Хром, IgE
	11-614	Аллерген к43 - Золото, IgE
	11-615	Аллерген к44 - Медь, IgE
	11-616	Аллерген к45 - Платина, IgE
	11-617	Аллерген к46 - Кобальт, IgE
	11-618	Аллерген к48 - Палладий, IgE
	11-619	Аллерген b1 - Акрил, IgE

Микробиологическая диагностика

	10-022	Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам		
	10-023	Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам		
	10-025	Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам		
	10-026	Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам		
	10-032	Грибковое поражение слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотикам		

Молекулярно-генетическая диагностика

09-118 Бактериальная предрасположенность к пародонтиту

Дополнительные исследования

	02-005	Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой	
	02-006	Общий анализ мочи с микроскопией осадка	
	03-005	Группа крови ABO	
	03-008	Резус-фактор	
	40-001	4 обязательных анализа, экспресс HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител и антигена p24), anti-HCV, антитела, HBsAg, Treponema pallidum, антитела	
	40-117	4 обязательных анализа антитела к ВИЧ 1/2 (anti-HIV), Treponema pallidum (антитела), HBsAg, anti-HCV (антитела)	
	08-052	Тиреотропный гормон (ТТГ)	
	08-047	Тироксин свободный (Т4 свободный)	
	06-015	Глюкоза в плазме	
	06-036	Билирубин общий	
	06-003	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	
	06-010	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	
	06-014	Гликированный гемоглобин (HbA 1c)	
	03-003	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	
	03-002	Антитромбин III	
	03-007	Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО)	
	03-010	Тромбиновое время	
	03-011	Фибриноген	

Внимание! Срок хранения образца биоматериала в лаборатории – 1 неделя.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки



Контейнер для мазка



Тупфер (красная крышки) для культивирования

Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (Stabilur)
(желтая крышка с красным кольцом)

ПрС Предметное стекло

2. Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть крышкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях. Затем перенести плазму в транспортную пробирку.

 Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую, предварительно охлажденную, транспортную пробирку

-20° Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии

КМ Контейнер (красная крышка) для забора мочи