

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ

		06-077	Гаптоглобин	
		06-078	Альфа-1-антитрипсин	
		06-080	Церулоплазмин	
		06-076	Тропонин I, количественно	
		06-157	NT-proBNP,количественно	
Липиды и липопротеины				
		06-009	Аполипопротеин А-1	
		06-008	Аполипопротеин В	
		06-041	Триглицериды	
		06-028	Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)	
		06-029	Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)	
		06-048	Холестерол общий	
		06-178	Липопротеин (а)	1
Углеводы				
		06-015	Глюкоза в плазме	
		06-115	Глюкоза в моче	КМ
Определение уровня гормонов и специфических маркеров				
Функция щитовидной железы				
		13-010	Антитела к рецептору ТТГ (анти-rТТГ)	
		13-087	Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ)	
		13-088	Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)	
		08-027	Кальцитонин в сыворотке	+4-20°
		08-051	Тиреоглобулин	
		08-118	Тиреотропный гормон (ТТГ)	
		08-116	Тироксин свободный (Т4 свободный)	
		08-115	Тироксин общий (Т4)	
		08-113	Трийодтиронин общий (Т3)	
		08-114	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	
Функция фертильности				
		08-003	17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ)	
		08-001	17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) указать суточный диурез мл	! КМ
		08-088	17-кетостероиды (17-КС) в моче указать суточный диурез мл	! КМ
		08-014	Андростендион	
		13-001	Антитела к овариальным (текальным) антигенам	
		13-003	Антитела к спермальным антигенам (в крови)	
		13-004	Антитела к спермальным антигенам (в сперме)	СК
		08-023	Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)	
		08-024	Дигидротестостерон	
		08-110	Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4)	
		08-111	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	
		08-112	Прогестерон	
		08-122	Пролактин	
		08-121	Макропролактин	
		08-117	Тестостерон	
		08-050	Тестостерон свободный	
		08-119	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	
		08-120	Эстрадиол	
		13-043	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка	
		08-089	Ингибин В	-20°
		08-093	Антимюллеровский гормон	-20°
Диагностика и мониторинг беременности				
		08-016	α-фетопротеин (альфа-ФП)	
		08-020	β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)	

08-056Эстриол свободный

08-034Плацентарный лактоген

</

Условные обозначения

- Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
- Микропробирики для забора капиллярной крови у детей
- Кровь для исследования берется в пробирку со светло-зеленой крышкой (с гепелин)
- Контейнер (красная крышка) для забора мочи
- Контейнер для забора кала
- Стерильный контейнер (сухой) без наполнителей, цвет крышки не имеет значения
- Предметное стекло
- Стерильная пробирка
- Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка
- Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу при 2000 g в течение 10 мин.
- Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть крышкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях. Затем перенести плазму в транспортную пробирку.
- Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую, предварительно охлажденную, транспортную пробирку
- Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
- Кровь на данное исследование берется в отдельную пробирку
- Биоматериал хранить и транспортировать при +37°C
- Защищать от света
- Образование сгустка при +4...+8°С
- pH
- Сточная моча на данное исследование собирается в контейнер с консервантом
- Пробирка вакуумная для мочи с консервантом
- Контейнер для кала с консервантом